

## 倉田 悟 ウスゲコバノイシカグマの諸産地

S. KURATA : New Localities for *Dennstaedtia scabra* form.  
*glabrescens* (CHING) TAGAWA.

本羊歯とコバノイシカグマとの区別は極めて微妙なもので、結局、葉柄上部から葉軸に  
汎り殆んど無毛のものをウスゲコバノイシカグマとして区別できる。コバノイシカグマで  
は葉柄・葉軸にかなり密毛を生じ、この毛は脱落してもその基部が著しい突起となつて残  
存する。ウスゲコバノイシカグマは葉身の両面の毛も確かに少いが、全く無毛ではなく脈  
上に散生した毛が出る。大体、コバノイシカグマの分布地域全体に点々と出現しており、  
品種としての区別が精一杯であろう。以下に検し得た標本産地を列挙する。伊豆河津町白  
川峠道（倉田悟，1959年），三河新城市七久保（鳥居喜一，1959年），伊勢大杉谷大日嵩附  
近（倉田，1952年），紀州尾鷲市九鬼（伊東博，1956年），紀州大雲取（児玉親輔，1910  
年），阿波大龍寺山（倉田，1960年），伊予上浮穴郡面河村栃原一高台越（井上浩，1953  
年），土佐尾川村大元（牧野富太郎，1887年，東京国立科学博物館所蔵），肥前黒髪山（田  
代善太郎，1910年，同館所蔵；倉田，1961年），肥後人吉市（前原勘次郎，1958年），肥後  
天草下島角山（井上繁武，1952年；城戸正幸，1960年），肥後水俣市無線山（倉田，1958  
年），薩摩大口市田代（山中鉄次，1959年），薩摩出水市上鯖淵芭蕉（春田正直，1959年），  
同湯川内温泉（同），薩摩紫尾山（城戸正幸，1959年），大隅屋久島小杉谷（児玉・木村，  
1923年；滝一郎，1956年），同栗生一花江河（川畑政親，1958年），同鯛ノ川（同；樋口雄  
一，1960年）。